

به نام خدا

وزارت آموزش و پرورش باشگاه دانش‌پژوهان جوان

مبارزه‌ی علمی برای جوانان، زنده کردن روح جستجو و کشف واقعیت‌هاست.

امام خمینی (ره)

مدت آزمون: ۵ ساعت

مسئله‌های پنج جوابی

پاسخ هر یک از مسائل زیر را در پاسخ‌نامه سیاه کنید. هر جواب درست چهار نمره‌ی مثبت و هر جواب نادرست یک نمره‌ی منفی دارد.

۱A) در یک مجموعه‌ی تفریحی تمرین تیراندازی در نظر گرفته شده است. با هر بليط می‌توان ۵ تیر شلیک کرد و به ازای هر تیر که به هدف بخورد، ۲ تیر جایزه داده می‌شود. علی با یک بليط ۱۷ شلیک انجام داده است. او چند بار به هدف زده است؟
الف - ۱۲ بار ب - ۳ بار ج - ۶ بار د - ۱۵ بار ه - نمی‌توان به صورت یکتا تعیین کرد.

۲A) یک دانش‌آموز در چند امتحان هوش صد نمره‌ای شرکت کرده است. در آخرین روز امتحان، دانش‌آموز با خودش حساب کرد که اگر در آخرین امتحان ۹۷ بگیرم، میانگین نمره‌های من ۹۰ و اگر ۷۳ بگیرم میانگین ۸۷ خواهد بود. او چند بار امتحان داده است؟
الف - ۴ بار ب - ۵ بار ج - ۶ بار د - ۷ بار ه - ۸ بار

۳A) یک دنباله از عددها به این صورت ساخته می‌شود: عدد اول این دنباله برابر با ۱ و پس از آن هر عدد برابر با مجموع عددهای قبل از خودش به اضافه‌ی یک است. n این عنصر این دنباله برابر با چند است؟
الف - n ب - $1 - 2^n$ ج - $2^n - 1$ د - 2^{n-1} ه - $1 - 2^n$

(۴A) مجموعه‌ی $\{1, 2, \dots, 100\}$ مفروض است.

- (a) به چند طریق می‌توان دو عدد صحیح از مجموعه‌ی A انتخاب کرد که مجموع آن‌ها عددی زوج باشد.
(b) به چند طریق می‌توان دو عدد صحیح از مجموعه‌ی A انتخاب نمود که مجموع آن‌ها عددی فرد باشد.

الف – ۲۵۰۰(b) ۲۵۰۰(a)
ب – ۲۴۵۰(b) ۲۵۰۰(a)
ج – ۲۴۵۰(b) ۲۴۵۰(a)
د – ۲۵۰۰(b) ۲۴۵۰(a)
ه – هیچ‌کدام

(5A) به چند طریق می‌توان جدول نیمه‌پر روبه‌رو را با عده‌های ۱ تا ۴ طوری پر کرد که در هیچ سطر و ستونی عدد تکراری نداشته باشیم؟

الف – ۰ ب – ۱ ج – ۲ د – ۳ ه – ۴!

(6A) از میان عده‌های زیر حداقل چند عدد را می‌توان انتخاب کرد به صورتی که میانگین عده‌های انتخاب شده بزرگ‌تریا مساوی ۱۵ باشد.

۲۱, ۱۴, ۱۳, ۱۷, ۱۵, ۱۶, ۲۳, ۱۲, ۸, ۱۱, ۱۲, ۹, ۵, ۴, ۱۶, ۲, ۱۴, ۱۵, ۱۸, ۸, ۳, ۱۶

الف – ۰ ب – ۱ ج – ۲ د – ۳ ه – ۴

(7A) در سرزمین عجایب چهار نوع آدم وجود دارد: درستکار باهوش، تبهکار باهوش، تبهکار احمق. آدم‌های درستکار باهوش و همچنین آدم‌های تبهکار احمق همواره راست می‌گویند. آدم‌های درستکار احمق و تبهکار باهوش همواره دروغ می‌گویند. به یک نفر از این سرزمین برمی‌خوریم. او به ما جمله‌ای می‌گوید که با استفاده از این جمله می‌توانیم، تعیین کنیم که او دقیقاً از چه نوعی است. این جمله چه می‌تواند باشد؟

الف – من احمق هستم.
ب – من درستکار احمق هستم.
ج – من درستکار باهوش هستم.
د – من تبهکار هستم.
ه – ب و د

۸A) در سرزمین عجایب به دو نفر به نام های A و B بخوردم. A به من چیزی گفت که نفهمیدم. B گفت: «A می گوید که یک درستکار احمق یا یک تبهکار باهوش است.» A با اعتراض گفت: «من این را نگفتم!» B گفت: «A تبهکار است.» و A در جواب گفت: «B احمق است!» با توجه به این مکالمات، A و B هر کدام از چه نوعی هستند؟

الف – با این اطلاعات نمی توان به طور دقیق نوع و را مشخص کرد.

ب – یک تبهکار احمق و B یک درستکار احمق است.

ج – یک درستکار باهوش و B یک تبهکار باهوش است.

د – یک تبهکار احمق و B یک درستکار احمق است.

ه – A یک درستکار باهوش و B یک درستکار احمق است.

۹A) در ساعت صفر، ۱۰ نفر با شماره های ۱ تا ۱۵ برای پر کردن سطل خود در مقابل یک شیر آب صاف کشیده اند. به محض این که سطل فردی که در جلوی شیر آب است پر می شود، او به کنار می رود و نفر بعدی در صفحه جای او را می گیرد. فرض کنید سطل نفر نام به اندازه ای است که پر کردن آن ۲ دقیقه طول می کشد. زمانی که نفر نام سطل خود را پر می کند را «زمان معطلي» نفر نام می ناميم. کدامیک از گزینه های زیر درباره مجموع زمان معطلي ۱۰ نفر درست است.

الف – مجموع زمان معطلي می تواند کمتر از ۲ دقیقه باشد.

ب – مجموع زمان معطلي می تواند بیشتر از ۲ دقیقه باشد.

ج – به هر ترتیبی که سطل ها پر شود مجموع زمان معطلي تغییر نخواهد کرد.

د – اگر افراد به ترتیب شماره هایشان در صفحه بايستند مقدار مجموع زمان معطلي کمینه است.

ه – اگر افراد به ترتیب عکس شماره هایشان در صفحه بايستند مقدار مجموع زمان معطلي کمینه است.

۱۰A) یک کشاورز پنج نوع محصول کشت می کند: لوبيا، ذرت، کلم، کدو، و نخود. او در هر سال دقیقاً سه محصول براساس قوانین زیر کشت می کند:

• اگر ذرت بکارد حتماً لوبيا هم می کارد.

• دو سال متوالی کلم کشت نمی کند.

• در هر سال بیش از یکی از محصول های سال بعد را دوباره کشت نمی کند.

اگر در یک سال کشاورز لوبيا، ذرت و کلم بکارد، در دو سال بعد کدامیک از ترکیبات زیر را باید بکارد؟

الف – کلم، ذرت، لوبيا

ب – نخود، ذرت، لوبيا

ج – نخود، کلم، لوبيا

د – کدو، نخود، لوبيا

ه – کدو، نخود، کلم

۱۱A) یک آجر در صورتی می افتد که هیچ آجر یا نیمه آجری در زیر آن نباشد. در شکل زیر حداکثر چند آجر می توان برداشت به صورتی که آجرهای بالایی پایدار بمانند. (بدیهی است حق برداشتن آجرهای بالایی را نداریم.)

۱۲A) شکل مقابل را در نظر بگیرید. مهره‌ی سیاه یک وزیر در این صفحه است و خانه‌هایی که تهدید می‌کند با نقطه‌چین مشخص شده‌اند. حداقل چند وزیر لازم است تا بتوان آن‌ها را طوری در صفحه چید که همه‌ی خانه‌ها را تهدید کنند؟

الف - ۲ ب - ۳ ج - ۴ د - ۵ ۶ - ه

۱۳A) در یک ایستگاه قطار، ریل‌ها به شکل زیر هستند:

همه‌ی ریل‌ها از سمت چپ به راست یک طرفه هستند. اگر ۵ قطار با شماره‌های ۱ تا ۵ به ترتیب ۵ و ۴ و ۳ و ۲ و ۱ از ورودی وارد این ریل‌ها شوند، کدام ترتیب برای خروج این قطارها ممکن نیست؟ (قطارها می‌توانند هر یک از دوراه رسیدن به خروجی را انتخاب کنند و همچنین می‌توانند مدتی روی ریل منتظر بمانند، ولی نمی‌توانند از روی هم عبور کنند. همچنین هر دو ریل به اندازه‌ی کافی طولانی هستند و می‌توانند تعداد زیادی قطار را در خود جا دهند.)

الف - ۴, ۱, ۲, ۵, ۳
ب - ۴, ۲, ۱, ۳, ۵
ج - ۲, ۳, ۴, ۵, ۱
د - ۲, ۳, ۵, ۱, ۴
ه - ۳, ۴, ۱, ۵, ۲

۱۴A) n دایره در صفحه رسم شده است. با رسم دایره‌ی بعدی تعداد نواحی ایجاد شده در صفحه توسط این دایره‌ها حداقل چه قدر می‌تواند افزایش یابد؟

الف - n ب - $n - 1$ ج - $n + 1$ د - $2n$ ه - $2n + 1$

۱۵A) یک دانش‌آموز به عنوان جرمیه باید عددهای بین ۱۰۰۱ و ۱۹۹۹ را دو به دو با هم جمع کند. (یعنی برای هر x که $1001 \leq x \leq 1999$ و هر y که $1001 \leq y \leq 1999$ باید یک بار $y + x$ را محاسبه کرده باشد). این دانش‌آموز هنگام جمع ده برعیک را منظور نمی‌کند. در چه تعداد از جمع‌ها جواب را درست به دست می‌آورد؟

الف - ۳۶ ب - ۴۵^۳ ج - ۴۵^۲ د - (۱۰۰)^۲ - ۴۵^۳ ه - (۱۰۰)^۳ - ۴۵^۲

۱۶A) در یک روش عددنویسی، ۱۹ رقم وجود دارد. ارقام ۰ تا ۹ و $\overline{۰ تا ۹}$ که به ترتیب دارای ارزش $۱ - تا - ۹$ است. مثلاً ۱۳۷۶ را می‌توان به صورت ۱۴۲۴ و ۱۸۶۲۴ نمایش داد. (چون $= ۱ \times ۱۰۰۰ + ۴ \times ۱۰۰ - ۲ \times ۱۰ - ۴ \times ۱$
 $= ۱ \times ۱۰۰۰۰ - ۸ \times ۱۰۰۰ - ۶ \times ۱۰۰ - ۲ \times ۱۰ - ۴ \times ۱$

معین کنید عدد ۲۵ دارای چند نمایش با حداکثر ۳ رقم است؟

- الف - ۱ ب - ۲ ج - ۳ د - ۴ ه - ۵

۱۷A) در شکل زیر چند مثلث وجود دارد که هر سه رأس آن نقاط پر رنگ است؟

- الف - ۱۱ ب - ۱۷ ج - ۲۰ د - ۲۹ ه - ۲۵

۱۸A) تعداد ۱۱ مکعب ((متمايز) مطابق شکل زیر روی یک میز قرار گرفته‌اند.

یک آدم آهنی می‌تواند در هر «حرکت» یک مکعب که رویش چیزی قرار ندارد را به روی میز یا روی یک مکعب دیگر منتقل کند. اگر هدف تغییر آرایش مکعب‌ها به یک صورت جدید (دلخواه) باشد، با حداقل چند حرکت می‌توانیم مطمئن باشیم که آدم آهنی می‌تواند مکعب‌ها را به آرایش جدید (که دلخواه است و مشخص) در آورد؟

- الف - ۲۴ ب - ۱۷ ج - ۱۴ د - ۱۱ ه - ۲۲

۱۹A) از هر یک از شهرهای یک استان به جزیکی که فقط یک جاده دارد، دقیقاً سه جاده خارج شده است. تعداد شهرهای این استان کدامیک از عده‌های زیر می‌تواند باشد؟

- الف - ۴ ب - ۵ ج - ۶ د - ۹ ه - ۱۳۷۷

هشتمین المپیاد ملی کامپیووتر ایران (مرحله‌ی اول)

۲۰A) دانش‌آموزی برای فارغ‌التحصیل شدن باید ۹ درس را بگذراند. برخی از این درس‌ها پیش‌نیاز هم هستند که این روابط پیش‌نیازی به صورت «» نمایش داده می‌شوند؛ به این معنی که a پیش‌نیاز b است و باید قبل از آن گذرانده شود. شکل زیر روابط پیش‌نیازی بین ۹ درس را نشان می‌دهد.

اگر این دانش‌آموز بتواند در هر ترم حداکثر سه درس را بگذراند به چند صورت می‌تواند در طی حداکثر ۴ ترم فارغ‌التحصیل شود؟

الف - ۱ ب - ۲ ج - ۳ د - ۴ ه - ۵

۲۱A) یک ماتریس 5×10 است که مقدار درایه‌های سطر اول آن برابر با یک و مقدار بقیه‌ی خانه‌های ستون اول و ستون پنجم آن برابر با صفر است و مقدار بقیه‌ی عناصر آن از رابطه‌ی زیر به دست می‌آید:

$$A_{i,j} = \frac{1}{2}(A_{i-1,j-1} + A_{i-1,j+1})$$

مقدار درایه‌های سطر نهم این ماتریس چه خواهد بود؟

الف - ۰ ب - ۰ ج - ۰ د - ۰ ه - ۰
 $\frac{1}{16}$ $\frac{1}{16}$ $\frac{1}{16}$ $\frac{1}{4}$ ۱

۲۲A) رشته‌ی babababba را در نظر بگیرید. در هر مرحله می‌توانیم دو حرف متوالی از این رشته را با هم جابه‌جا کنیم. حداقل تعداد مراحل لازم برای این که بتوانیم به رشته‌ای برسیم که در آن همه‌ی a ها در کنار b هم و همه‌ی b ها نیز در کنار b قرار گرفته باشند، چند مرحله است؟

الف - ۹ ب - ۱۰ ج - ۱۱ د - ۱۲ ه - ۱۳

(۲۳A) شکل مقابل حداقل با چند بار برداشتن قلم از روی کاغذ قابل رسم است؟

الف - ۳ ب - ۴ ج - ۵ د - ۶ ه - ۷

(۲۴A) فرض کنید که شهرهای ۱ تا ۷ دور دایره‌ای به شکل زیر می‌باشند. (بین شهرهای مجاور جاده وجود دارد). حداکثر چند جاده‌ی دیگر می‌توان بین این شهرها کشید به طوری که هیچ دو جاده‌ای هم‌دیگر را قطع نکنند و بین هر دو شهر حداکثر یک جاده‌ی مستقیم وجود داشته باشد. (جاده‌ها هم می‌توانند در داخل دایره و هم در خارج آن کشیده شوند).

الف - ۶ ب - ۷ ج - ۸ د - ۹ ه - ۱۰

(۲۵A) می‌خواهیم در عبارت زیر سه تا از ۶ علامت ضرب را به جمع تبدیل کنیم، به طوری که مقدار A مینیمم شود.

$$A = 5 \times 6 \times 4 \times 3 \times 2 \times 7 \times 8$$

حداقل مقدار A چه قدر خواهد بود؟

الف - ۶۴ ب - ۶۰ ج - ۸۴ د - ۷۹ ه - ۶۹

(۲۶A) از مجموعه‌ی $\{1, 2, \dots, 6\}$ چند زیرمجموعه می‌توان انتخاب کرد که شامل دو عضو متولی نباشند؟

الف - ۶۴ ب - ۲۱ ج - ۳۶ د - ۱۵ ه - ۳۰

(۲۷A) یک دستگاه نمایش اعداد از ۷ پاره خط تشکیل شده که با روشن کردن چراغ های مشخص شده در شکل زیر ارقام ۰ تا ۹ را نشان می دهد.

برای نمایش اعداد ۰ تا ۹ از یک نمایش دهنده دو رقمی استفاده می کنیم. متأسفانه چراغ بعضی از پاره خط ها سوخته است.
حال اگر دستگاه، شکل زیر را نمایش دهد عدد واقعی چند حالت متفاوت دارد؟

الف — ۱۲۹ ب — ۷ ج — ۸ د — ۱۲۸ ه — ۵

(۲۸A) شکل مقابل نقشه‌ی خیابان‌های یک شهر است. نقاط سیاه مراکز پلیس و خطوط خیابان‌های شهر هستند. به علت ازدیاد مراکز پلیس وزارت کشور می‌بایست در هر شهر مجموعه‌ای از مراکز را انتخاب کند به گونه‌ای که اولاً هیچ خیابانی وجود نداشته باشد که مراکز پلیس هر دو سرش انتخاب شده باشد، و ثانیاً اگر حتاً یک مرکز دیگر به آن مجموعه اضافه شود آنگاه خیابانی وجود داشته باشد که مراکز پلیس هر دو سرش انتخاب شده باشد.

وزارت کشور به چند طریق می‌تواند این مجموعه را انتخاب کند؟

الف — ۱۲۹ ب — ۷ ج — ۸ د — ۱۲۸ ه — ۶۴

(۲۹A) مطابق شکل به ترتیب اعداد ۳۰، ۴۵، ۱۲، ۱۸، ۶۰، ۲۴، ۱۲، ۱۸، ۴۲، و ۱۰۵ دور دایره‌ای نوشته شده‌اند. در هر مرحله بین هر دو عدد روی دایره بزرگ‌ترین مقسوم‌علیه مشترک آن‌ها را می‌نویسیم و همه‌ی اعداد مرحله‌ی قبل را پاک می‌کنیم. اگر ۱۳۷۶ بار عمل فوق را انجام دهیم مجموع اعداد باقیمانده چند است؟

الف — ۲۳۶ ب — ۱۶۸ ج — ۲۴ د — ۷۲ ه — ۱۰۰

(۳۰A) میوهفروشی میخواهد مقداری میوه برای فروش بخرد. دو نوع میوه موجود است: پرتقال و سیب. قیمت خرید هر کیلو پرتقال ۲۰۰ تومان و قیمت فروش آن ۲۲۰ تومان است. قیمت خرید هر کیلو سیب هم ۱۰۰ تومان و قیمت فروش آن ۱۲۰ تومان است. میوهفروش میخواهد حداکثر به اندازه‌ی ۱۶۰۰۰ تومان خرید کند. همچنین به خاطر مسئله‌ی حمل و نقل، او حداکثر میتواند مجموعاً به اندازه‌ی ۱۰۰ کیلو جنس بخرد. حداکثر مقدار سودی که میوهفروش میتواند از فروش جنس‌هایی که میخرد ببرد چند تومان است؟

الف - ۲۶۰۰ ب - ۲۵۰۰ ج - ۳۰۰۰ د - ۲۴۰۰ ه - ۲۳۳۳

(۳۱A) تمام عددهای سه رقمی که صفر ندارند را با هم جمع میزنیم، حاصل جمع در کدام محدوده قرار دارد؟

الف - ۴۰۰۰۰ تا ۳۹۶۰۰۱
ب - ۴۰۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰۱
ج - ۴۱۰۰۰۰ تا ۴۰۵۰۰۱
د - ۴۱۵۰۰۰ تا ۴۱۰۰۰۱
ه - ۴۲۰۰۰۰ تا ۴۱۵۰۰۱

مسئله‌های بله-خیر

پاسخ هر یک از مسائل زیر «بله» یا «خیر» است که باید در پاسخ‌نامه خانه‌های مربوط به آن سیاه شود. هر جواب درست دو نمره‌ی مثبت و هر جواب نادرست دو نمره‌ی منفی دارد.

(۱B) خانه‌های جدول زیر را میخواهیم با عددهای ۱ تا ۳ چنان پرکنیم که در هر سطر (و همچنین در هر ستون) اگر مثلاً k تا خانه‌ی خالی وجود دارد، عددهای ۱ تا k (البته نه لزوماً به همین ترتیب) قرار بگیرند. آیا این عمل امکان‌پذیر است؟

۲B) چهار نقطه‌ی رو به رو را در نظر بگیرید. دو نفر به نام‌های اکبر و باقر به ترتیب زیر با هم بازی می‌کنند. ابتدا اکبر شروع به بازی می‌کند و پس از آن یک در میان به نوبت بازی می‌کنند. هر یک از دو بازی کن در نوبت خودش بین دو نقطه که تا حالا به هم وصل نشده‌اند یک پاره خط راست می‌کشد. اولین کسی که باعث ایجاد یک مثلث در شکل بشود بازنشده است. آیا اکبر می‌تواند چنان حرکت کند که همیشه بازی را ببرد؟

۳B) ۶ لیوان دریک ردیف قرار داده شده‌اند. در هر مرحله می‌توانیم ۵ تا از این لیوان‌ها را انتخاب کرده، هر پنج تا را وارون کنیم. آیا با تکرار این عمل‌ها می‌توان هر ۶ لیوان را وارون کنیم؟

۴B) در شبکه‌ی روبرو آیا می‌توان از یک تقاطع شروع کرد و مسیری را طی کرد که در آن از هر یک از تقاطع‌های دیگر دقیقاً یک بار بگذریم و دوباره به همان تقاطع اولیه برسیم؟

۵B) در شکل الف می‌بینید که سه صابون در دیواره‌ها محصور شده‌اند. می‌خواهیم وضعیت مشخص شده را به حالت تبدیل بکنیم. برای این کار حق داریم به صابون‌ها در جهت‌های افقی یا عمودی ضربه بزنیم. صابون‌ها در جهت ضربه حرکت می‌کنند تا به یک مانع (دیوار یا صابون دیگر) برسند و سپس می‌ایستند. دقت کنید که صابون‌ها حق دوران ندارند. آیا می‌توان این کار را انجام داد؟

۶B) ۱۳۷۶ سنگریزه و دو بازی کن داریم. هر بازی کن در نوبت خود می‌تواند ۱ یا ۲ یا ۴ سنگریزه برای خود بردارد. کسی که آخرین سنگریزه را بردارد برنده است. آیا فرد اول می‌تواند طوری بازی کند که حتماً برنده شود؟

۷B) ۵ نفر با وزن‌های ۸۰، ۸۰، ۴۰، ۳۰، و ۲۰ کیلوگرم در یک طرف رودخانه ایستاده‌اند و قایقی دارند که ظرفیت آن ۸۰ کیلوگرم است. آیا آن‌ها می‌توانند با استفاده از این قایق به سوی دیگر رودخانه بروند؟ (در هر بار ردد شدن قایق از رودخانه باید حداقل یک نفر برای هدایت آن در قایق باشد).

۸B) در کشوری تعدادی شهر وجود دارد و بعضی از شهرها با جاده به هم متصل‌اند. می‌خواهیم به هر یک از این شهرها یک مجموعه از عددهای صحیح را نسبت دهیم، به طوری که مجموعه‌های نسبت داده شده به هر دو شهری که به هم با یک جاده به طور مستقیم متصل‌اند با هم اشتراک ناتھی داشته باشند و اشتراک مجموعه‌های نسبت داده شده به هر دو شهری که با جاده‌ای به صورت مستقیم به هم متصل نیستند، تهی باشد. آیا این کار همواره ممکن است؟

۹B) یک ترتیب از عددهای ۱ تا ۱۰ به ما داده شده است. دو عمل زیر را می‌توانیم بر روی هر ترتیب انجام دهیم:

- عنصر اول و دوم ترتیب را جایه‌جا کنیم.
- عنصر اول ترتیب را برداشته، آن را در آخر ترتیب قرار دهیم.

آیا با استفاده از دو عمل فوق، می‌توانیم ترتیب داده شده را مرتب کنیم؟

۱۰B) آیا می‌توان به رؤوس شکل زیر اعداد از ۰ تا ۶ را طوری نسبت داد که هر عدد از اعداد ۱ تا ۶ قدر مطلق تفاضل دو سر یک پاره خط باشد؟

۱۱B) رشته‌ی اعداد طبیعی را از ۱ شروع کرده و با هم جمع می‌زنیم. آیا ممکن است پس از جمع کردن چند عدد، به مجموعی سه رقمی با ارقام یکسان برسیم؟

۱۲B) شهرهای A و B و C و D و E و F در شکل مقابل توسط خیابان‌های یک‌طرفه‌ای که هر یک را با یک پیکان نشان داده‌ایم به هم وصل شده‌اند. مقدار مصرف بنزین برای عبور از یک خیابان عددی است که روی آن خیابان نوشته شده است. آیا می‌توان سفری را از رأس A شروع کرد و با عبور از خیابان‌ها و مصرف دقیقاً ۲۱ واحد بنزین به شهر F رسید؟

۱۳B) جدول 3×3 روی رو با عدددهای صحیح پر شده است. در هر مرحله می‌توانیم به دو خانه‌ی مجاور در این جدول یک عدد صحیح اضافه نموده و یا از آن‌ها یک عدد صحیح را کم کنیم. آیا با استفاده از این عمل‌ها می‌توان تمام خانه‌های این جدول را صفر نمود؟

۱۴B) دو گروه از افراد که هر گروه دارای سه نفر است را در نظر می‌گیریم. برای هر شخص یک مجموعه‌ی ۲ عضوی از عدددهای طبیعی اختصاص می‌دهیم. هر شخص یکی از این اعداد اختصاص یافته به خود را انتخاب می‌کند. می‌خواهیم انتخاب‌ها چنان باشد که هیچ دو نفری از دو گروه متفاوت عدددهای یکسانی انتخاب نکرده باشند. آیا این کار همواره ممکن است؟

۱۵B) ۲۰ تیم به صورت دوره‌ای با هم بازی کرده‌اند (هر دو تیمی با هم دقیقاً یک بازی انجام داده‌اند)، جایگشتی از این تیم‌ها را داریم. اگر در این جایگشت دو تیم متولی x و y باشند که x از y باخته باشد، جای x و y را عوض می‌کنیم. آیا این عمل می‌تواند تا بی‌نهایت ادامه داشته باشد؟